



โรควัณโรค (Tuberculosis)



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

สาเหตุ

- เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
- ติดต่อกับผู้ป่วยไอจาม ไม่ปิดปากปิดจมูก
ผู้ป่วยใกล้หายใจรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย



อาการ

- ไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์
- น้ำหนักลดและเบื่ออาหาร
- มีไข้ต่ำๆตอนบ่ายหรือเย็น



กลุ่มเสี่ยง... วัณโรค



ผู้อาศัยร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค



ผู้ป่วยเบาหวาน



ผู้ติดเชื้อ HIV



ผู้สูงอายุ

การรักษา



- กินยารักษาวัณโรคที่มีประสิทธิภาพสูง
- กินยาครบทุกมื้อ ครบทุกเม็ด ไม่ดื้อยา
- ใช้เวลาในการรักษา 6 - 8 เดือน



การป้องกัน



- เลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค
- ควรตรวจร่างกายโดยการเอกซเรย์ปอด
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- หากมีอาการน่าสงสัยว่าจะเป็นวัณโรค
ควรรีบไปพบแพทย์ ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน



Website



Facebook






วัณโรค Tuberculosis

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อกับคนสู่คน
ผ่านทางละอองเสมหะที่เกิดจากการไอ จาม
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ



อาการ

ระยะแรกอาการมักไม่ชัดเจนให้สังเกตอาการตนเอง
ถ้าไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์มีไข้ต่ำๆช่วงบ่าย
เหงื่อออกตอนกลางคืน น้ำหนักลด
เบื่ออาหาร อาจเป็นวัณโรคได้



การรักษา

เมื่อมีอาการควรรีบพบแพทย์
วัณโรครักษาหายได้
ด้วยยารักษาที่มีประสิทธิภาพสูง
กินยาให้ครบ 6-8 เดือน



การป้องกัน ดูแลรักษาผู้ป่วยให้หายขาด
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น ใช้ผ้าปิดปากจมูกเมื่อไอจาม
ผู้สัมผัสร่วมบ้านแยกข้าวของเครื่องใช้ ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย
หากมีอาการสงสัย ควรรีบไปปรึกษาแพทย์

